

Resultado de hembras Alimentadas en lactancia anterior con LIPOFEED y su eficiencia al siguiente parto
 feb-11

Granja Prodicen
Dr Carlos Alvarez

Grupo hembras TESTIGO

	No hembra	LNV	LNLM	MOMIAS
1	464	10		
2	304	9		
3	494	4		1
4	485	7	1	
5	303	8		
6	298	12	1	
7	275	14		
8	239	12		
9	285	12		
10	277	13		
11	96	9		
12	104	9		
13	102	11		
14	28	12		
15	9905	12		
16	68	13		
17	67	9	1	1
18	9758	13	2	
19	9873	8		
20	9840	8		
21	9665	8		
22	9653	11	1	
23	9722	10	1	
24	10679	10		
25	10928	11		
26	10797	10		
27				

LNV	265	7	2
No Partos	26	26	26
X LNV Parto	10.192	0.269	0.077

10.462

Grupo Hembras LIPOFEED

	No hembra	LNV	LNLM	MOMIAS
	487	7	2	1
	484	4		
	491	7	2	1
	476	10		
	474	11	2	2
	482	10		2
	478	7		
	284	11	2	
	457	7	1	
	289	9		1
	66	15		
	87	12		
	79	14		1
	9891	11		
	9884	9		
	62	10		
	58	10		
	9861	12		2
	9878	13		
	9868	12		2
	10950	13		1
	9526	11		
	9725	13	1	1
	9661	11		
	9449	12		
	10841	10		
	10819	10		


LNV	281	10	14
No Partos	27	27	27
X LNV Parto	10.407	0.370	0.519

10.778


0.316

Diferencial
LNV 0.215

1
Eficiencia de hembras suplementadas en lactancia anterior con Lipofeed en cuanto a LNV, LNM, Momias



**Lechones nacidos totales por parto Promedio
Testigo VS LIPOFEED**



0.316